

Description de trois nouvelles formes du genre
Dorcadion Dalm. (Col. Cerambycidae)

PAR

S. BREUNING

PARIS

Monsieur JUAN VIVES DURAN était si aimable de me communiquer un petit lot de *Dorcadion* espagnols pour étude. Parmi ces spécimens il se trouvaient trois formes nouvelles dont les descriptions suivent. Tous les types et le paratype se trouvent dans la collection de Monsieur VIVES DURAN.

Dorcadion (Iberodorcadion) turdetanum Lauff. m. **superdenudatum** nov.

Comme m. *denudatum* Esc., mais la bande humérale blanche réduite à quelques très petites taches situées dans la moitié antérieure de l'élytre.

Type, un ♂ de Puerto de Oncala, prov. de Soria, 8-VI-1966 (J. VIVES leg.). Un paratype récolté avec le type.

Dorcadion (Iberodorcadion) turdetanum Lauff. m. **vivesi** nov.

Comme la forme typique, mais l'intervalle latéro-huméral non dénudé du tout et les pattes noirâtres.

Type, un ♂ de Puerto Cuarto Pelado, prov. de Teruel, 17-VI-1957 (J. VIVES leg.).

Dorcadion (Iberodorcadion) navasi Esc. ssp. **tarraconense** nov.

Comme la forme typique, mais les élytres sans trace de poils dressés, les deux bandes blanches du disque du pronotum réunies à la base et les bandes latérale et humérale très étroites.

Type, un ♂ de La Mola de Coldejou, prov. de Tarragona, 9-V-1965 (M. GONZALEZ leg.).