

BIBLIOGRAFIA

- CRAMP, S., 1977. *Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa*. Vol. 1. Oxford Univ. Press. Oxford.
- ELISSON, I., 1965. Notas sobre aves de Mallorca. *Ardeola*, 10: 53-54.
- MUNTANER, J. & CONGOST, J. 1979. Avifauna de Menorca. *Treb. Mus. Zool. Barcelona*. 1: 174 pp.
- NOVAL, A., 1975. *El libro de la fauna ibérica*. Naranco. Oviedo.
- PARR, D., 1968. Notas sobre aves en Mallorca (Abril 1967). *Ardeola*, 12 (2): 218-223.
- SARGATAL, J. & LLINÀS, R., 1978. *Els ocells de l'Empordà*. Centre Excursionista Empordanès. Figueres.
- WALLACE, D. I. M. & SAGE, B. L., 1969. Las aves de la Costa Brava (Cataluña). *Ardeola*, 14: 143-157.
- XIMENIS, J., 1977. Notas ornitológicas breves: *Egretta alba*. Garceta Grande. *Ardeola*, 22: 106.

NUEVAS CITAS DE *XENUS CINEREUS* (GÜLD.) (AVES, SCOLOPACIDAE) PARA LA PENINSULA IBERICA

XAVIER FERRER, ALBERT MARTINEZ, ANNA MOTIS & JORGE MUNTANER

Ferrer, X., Martínez, A., Motis, A. & Muntaner, J., 1979. Nuevas citas de *Xenus cinereus* (Aves, Scolopacidae) para la Península Ibérica. *Misc. Zool.*, 5: 185-186. Barcelona.

Three new records for the Iberian peninsula (23.07.78, 1 ex., 9.06.79, 3 ex. and 5.08.79, 1 ex.) of *Xenus cinereus* (Güld.) are presented here. All of them observed in the "salinas" and salt marshes of the Ebro delta (NE Spain).

Xavier Ferrer, Jorge Muntaner, Dpto. de Zoología, Fac. de Biología, Universidad de Barcelona, Barcelona 7.- Albert Martínez, Anna Motis, c/. Cerdeña 476, Barcelona 25.

La presente nota tiene por objeto dar a conocer tres observaciones de *Xenus cinereus* en el delta del Ebro.

Xenus cinereus nidifica en el norte de Siberia y Rusia, extendiéndose hasta la Rusia blanca y el golfo de Botnia. Sus movimientos se canalizan claramente hacia el sur, por el mar Negro y Caspio para invernar en África oriental (GEROUDET, 1967), siendo un divagante en la mayoría de países de Europa occidental. No obstante, en el delta del Ródano (Francia), desde la primera captura en 1967, consideran a esta especie como regular en los dos pasos (HAFNER, 1975).

Para la península Ibérica solamente existían una cita vaga en Gerona (VAYREDA, 1883), la mención de Irby sobre un ave capturada cerca de Málaga y el ejemplar fotografiado por R. Melcher el 14.05.74 en las marismas de Hinojos (LÉVEQUE, 1977).

Las nuevas citas de *Xenus cinereus* son:

- 23.07.78 1 ejemplar con plumaje estival en las salinas de la Tancada (A. Martínez, A. Motis, J. Muntaner).
- 9.06.79 3 ejemplares en marisma salada de la Punta de la Banya (X. Ferrer).
- 5.08.79 1 ejemplar con plumaje estival en las salinas de la Tancada (A. Martínez, A. Motis).

Debido a la escasez de observaciones de esta especie, transcribimos las descripciones hechas «in situ» de los ejemplares del 27.07.78 y del 9.06.79. En todas ellas se dispuso de catalejo de 15-60 × 60.

El 23.07.78 se observó un ejemplar durante largo rato y a muy corta distancia, comiendo junto a *Calidris ferruginea* y

Charadrius alexandrinus en las salinas de la Tancada.

La conducta alimentaria recordaba a un *Calidris* (nerviosa y rápida). El plumaje era estival. Dorso pardo claro con una difusa V oscura. Los bordes del ala y las primarias oscuras daban la apariencia, cuando plegadas, de borde alar oscuro. Cuello no muy largo pero tampoco corto. Cabeza pardo claro con lista superciliar. Pico negro, largo y curvado claramente hacia arriba. Pecho manchado de marrón y patas anaranjado vivo.

En vuelo se le apreció una muy clara banda blanca que recorría el borde posterior del ala.

El 9.06.79, en lucios entre salicornias de la Punta de la Banya, observados largo rato tres ejemplares en reposo junto a *Charadrius alexandrinus*, a unos 100 m de distancia y con visibilidad muy buena.

Dorso con goterones de color gris. Vértice flexor conspicuamente oscuro. Cuello y flancos con algunas pintas grises. Cabeza gris tenue, casi blanca, con pequeñas pintas. Pico fino, negruzco, de un tamaño considerable, sensiblemente curvado hacia arriba. Ojos negros. Ligera lista superciliar blanca que llega hasta el pico. Vientre blanco. Patas cortas gris amarillento.

BIBLIOGRAFIA

- GÉROUDET, P., 1967. *Les échassiers*. Delachaux & Niestlé. Neuchâtel.
- HAFNER, H., 1975. Compte rendu ornithologique camarguais pour les années 1972 et 1973. *La terre et la vie*, 29: 100-112.
- LEVEQUE, R., 1977. Notas ornitológicas breves: *Tringa cinereus*. *Ardeola*, 22: 134.
- VAYREDA, E., 1883. *Fauna ornitológica de la provincia de Gerona*. Gerona.

NOTA SOBRE LA ALIMENTACION DEL MOCHUELO COMUN *ATHENE NOCTUA* (AVES, STRIGIDAE)

ANTONI AGELET

Agelet, A., 1979. Nota sobre el mochuelo común *Athene noctua* (Aves, Strigidae). *Misc. Zool.*, 5: 186-188. Barcelona.

In this note are studied the contents of the pellets of *Athene noctua* collected in a nest located in the surroundings of Balaguer (Lérida). The result of the analysis is reflected in the relation presented, and it's necessary to point out the presence of *Apus apus* among the findings.

Antoni Agelet, Secció d'Ornitologia, Museu de Zoologia, Ap. de Correus 593, Barcelona 3.

Hacia mediados de junio de 1976, fue localizado un nido de Mochuelo común (*Athene noctua*) que contenía tres pollos que todavía presentaban plumón en el cuerpo, y a falta de once días para emprender el vuelo.

Estaba situado en un pequeño barranco hacia las afueras de la ciudad de Ba-

laguer (Lérida), y localizado en un pequeño cortado de conglomerados de unos 4 m. de altura. Era una excavación hacia mitad de la pared que conducía a una cámara final ovalada en donde se hallaban los pollos.

Los alrededores del nido era un medio claramente antropógeno, con campos de